

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-9-84418627

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

(95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 41

du 20 Septembre 1984

V I G N E

*** Pourriture grise : ne plus intervenir.**

Les conditions climatiques dernières ayant été peu favorables, le Botrytis a été freiné, notamment dans les parcelles où un bon effeuillage a été réalisé. Les vendanges approchent et il n'est plus utile d'intervenir maintenant.

Traitement à réaliser après vendange mécanique

Dans les vignes vendangées mécaniquement, il est recommandé de faire un traitement avec un fongicide contenant du Captafol, Cuivre ou Fopel, dans les 5 jours après le passage de la machine.

Il facilitera la cicatrisation des bois abîmés par la machine et évitera ainsi le développement du Botrytis à partir des blessures. Ce Botrytis est, en effet, parfois la cause d'accidents de débourrement au printemps.

A G R U M E S

*** Cicadelles vertes : le vol débute.**

Sauf situations exceptionnelles, ne pas intervenir pour le moment. La population ne s'élèvera nettement qu'après les vendanges.

*** Gommose : application à la fin septembre.**

Cette maladie détruit l'écorce au niveau du collet. Elle se manifeste par des exsudations de gomme et un jaunissement des feuilles.

==> Evitez la stagnation de l'eau auprès des collets (ne pas laisser les goutteurs trop près du tronc, faciliter l'écoulement de l'eau).

==> Effectuez une pulvérisation de Phoséthyl-al (Aliette) : 200 g. de M. A./Hl. Utiliser 1.500 l. de bouillie à l'hectare.

CULTURES MARAICHERES

*** Salades**

Avant la plantation on peut assurer la protection :

==> contre les noctuelles avec :

acephate	Orthène 50 : pulvérisation
carbaryl	Sévin : appat ou pulvérisation
chlorpyrifos éthyl	Dursban 5 G et appat
phoxime	Volaton 5 : granulés
cyperméthrine	Cymbush, Kafil super, Ripcord 5 : pulvérisation
deltaméthrine	Décis : pulvérisation
perméthrine	Ambush et Perthrine : pulvérisation

==> contre les limaces avec :

mercaptodiméthur	Mesurool : appat et granulés
métaldéhyde	Diverses spécialités : appat et granulés.

Les formulations à base de lindane sont déconseillées.

Pendant la végétation, avec les arrosages, les risques de **Mildiou** et **Botrytis** sont importants :

==> contre le Mildiou, sont utilisables des produits à base de manèbe, zinèbe, mancozèbe ou thirame, ainsi que cymoxanil + manèbe (Fulvax , Rémiltine), phosethyl-al + mancozèbe (Rhodax).

==> contre le Botrytis, utilisez des spécialités à base de thirame, folpel ou iprodione,

ou vinchlozoline
procymidone > Interdit sur jeunes plantes

- * Renouveler tous les 5 à 7 jours, suivant le risque et la croissance de la plante.
- * Si des arrosages sont nécessaires, les prévoir la veille du traitement.
- * Dernier traitement : stade 15 à 17 feuilles.

(C) copyright : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1984 - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.
